

Aus der Frauenklinik der Universität Bonn
Direktor: Geh. Rat Prof. Dr. von F r a n q u é

Die Geburt bei Kyphoskoliosen

INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung

der

DOKTORWÜRDE

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität zu Bonn

Vorgelegt am 20. Juli 1934

von

HEINRICH LIENKAMP

aus Gladbeck i. W.



Bonn 1936

Buchdruckerei KUBENS Nachflg., Maxstr. 75.

Gedruckt mit Genehmigung
der mediz. Fakultät der Universität Bonn

Referent : Prof. Dr. v. Franqué



Die Geburt bei Kyphoskoliosen.

Wenn man die Störungen im Verlauf der Gravidität bei kyphoskoliotischen Schwangeren rechtzeitig erkennen und die Gefahren, die diesen Schwangeren besonders in der Gestationsperiode drohen, richtig beurteilen will, ist es erforderlich, daß man ein klares Bild gewinnt über den Einfluß, den derartige Wirbelfäulenverkrümmungen auf die Gestalt des Beckens und damit auch auf den Geburtsverlauf ausüben. Denn es ist eine bekannte Tatsache, daß Deviationen der Wirbelfäule, welchen Ursprungs sie auch immer sein mögen, in hohem Maße die Gestaltung des Beckens mitbestimmen können. Während einfache, bogenförmige Exkursionen der Wirbelfäule im Sinne einer Kyphose für das Becken nahezu bedeutungslos sind, vermögen winklige Gibbositäten einen hohen Einfluß auf die Form des Beckens zu gewinnen, besonders dann, wenn die kyphotische Krümmung der Wirbelfäule im Kindesalter — also vor Abschluß des Knochenwachstums — sich entwickelt. Eine erst nach Abschluß des Knochenwachstums entstehende Kyphose kann natürlich die fertige Gestalt des ausgewachsenen Beckens nicht mehr beeinträchtigen, höchstens werden die kompensierten Krümmungen der Wirbelfäule eine andere Neigung des Beckens hervorrufen. Um die Formveränderungen, die das Becken bei Kyphoskoliosen durchmacht, richtig zu verstehen, ist es notwendig, die Veränderung, die eine Kyphose und eine Skoliose am Becken hervorrufen, gesondert zu besprechen.

Die Gestaltsveränderung des Beckens bei Kyphosen.

Nicht nur das Alter, in dem eine Kyphose erworben ist, spielt für die Gestaltung des Beckens eine Rolle, sondern auch die Höhe des Sitzes. Bei kyphotischen Krümmungen

der Wirbelsäule im Cervikal- oder Dorsalsegment ist der untere Schenkel der Wirbelsäule lang genug, um durch kompensatorische Krümmungen die Störungen der Belastungsmechanik wieder auszugleichen. Anders ist es bei Kyphosen im Lumbalsegment. Hier ist der untere Schenkel der Wirbelsäule zu kurz, um einen Ausgleich der gestörten Wirbelmechanik durch eine kompensierende lordotische Krümmung zu ermöglichen. Es ist selbstverständlich, daß die abnorme Einwirkung der Rumpflast auf die Gestalt des Beckens um so größer wird, je näher die kypotische Krümmung an das Os sacrum heranreicht. Welche Veränderungen in der Beckengestaltung werden nun durch die oben beschriebenen Veränderungen der Wirbelsäule herorrufen?

Zunächst wird die Neigung des Beckens mehr oder weniger beeinflußt. Wie R o k i t a n s k y schon im Jahre 1839 beschrieben hat, fällt je nach dem Sitze des Höckers dem oberen oder unteren Schenkel des Höckers der größere Anteil der kompensierenden Krümmung zu. Je nach diesem ist die Inklination des Beckens verschieden. Während beim Sitz des Höckers in der oberen Lendenwirbelsäule der untere Schenkel zu klein ist, um eine kompensierte lordotische Krümmung zu bewirken und der obere Schenkel — also die Brustwirbelsäule — diese Aufgabe der Kompensation übernimmt, wird beim Sitz des Höckers im Brustmark der in der Lendenwirbelsäule verlaufende Unterschenkel die Kompensation bewerkstelligen. Im ersten Fall wird die Beckenneigung normal sein, während im anderen Fall die Beckenneigung um so größer wird, je höher der Sitz der kyphotischen Krümmung liegt.

Anders liegen die Verhältnisse beim Sitz des Höckers im unteren Lumbalsegment, wo das Kreuzbein selbst den unteren Schenkel der Höckerkrümmung darstellt. Bei diesen Deformitäten der Wirbelsäule wird das Becken nach der Horizontalebene emporgehoben. Die Neigung wird also geringer.

Aber nicht nur auf die Beckenneigung hat die Kyphose der Wirbelsäule einen Einfluß, sondern auch auf die Stellung der Beckenknochen. Da das sacrum, der eigentliche Träger der Rumpflast, in all diesen Fällen einer abnormen Belastung ausgesetzt ist, wird mithin dieses am intensivsten seine Lage und Stellung ändern, und zwar wird es, wenn die Kyphose nicht zu spät erworben ist, immer retroponiert, d. h. nach dorsalwärts zwischen die Beckenknochen verschoben sein. Es wird also von den hinteren Darmbeinenden nicht überragt sein wie beim normalen Becken. Diese Retroposition des Sacrum ist ein nie fehlendes Merkmal bei einer Kyphose. Häufig findet außer dieser Lageveränderung des Kreuzbeins noch eine Frontalrotation statt.

Neben dieser veränderten Stellung, die das Kreuzbein einnimmt und in einer sagitalen Streckung desselben gipfelt, befinden sich die Seitenbeckenknochen bei der Kyphose ebenfalls in abnormer Stellung. Die Darmbeinkämme weichen infolge der veränderten Belastungsmechanik etwas auseinander, während die Sitzbeine näher zusammenrücken. Durch diese Erscheinung wird eine weitere Haupteigenschaft der durch Kyphose verunstalteten Becken hervorgerufen, die Querverengung des Beckenausgangs. All diese Eigenschaften bedingen die sog. Trichterform des Beckens.

Die Gestaltsveränderung des Beckens bei Skoliosen.

Ganz anders verhält sich die Form des Beckens bei den skoliotischen Krümmungen der Wirbelsäule. Wenn auch diese Veränderungen häufig sehr gering sind und oft nur bei eingehendster Untersuchung erkannt werden können, so dürfte es doch zum Verständnis der durch Kyphoskoliose bedingten Beckenveränderung wertvoll erscheinen, etwas näher darauf einzugehen.

Ganz allgemein kann man hierbei wieder sagen, daß die durch Skoliose der Wirbelsäule bedingten Veränderungen des Beckens um so größer sind, je eher die Skoliose erworben, je stärker sie ausgesprochen und je näher sie dem Becken

gelegen ist. Es ist eine bekannte Tatsache, daß die Skoliose der Wirbelsäule nicht allein in der seitlichen Krümmung besteht, sondern es findet mit jeder beträchtlichen Seitenkrümmung gleichzeitig eine Drehung der Wirbel um ihre Achse statt, eine „*Rotatio spinæ*“ in dem Sinne, daß die Wirbelkörper immer nach der Konvexität, die Dornfortsätze nach der Konkavität sehen. Genau wie bei der kyphotischen Krümmung, so wird auch bei der Skoliose jede Krümmung durch eine sekundäre nach entgegengesetzter Richtung kompensiert.

Daß diese Rotation und Torsion der Wirbelsäule, wie wir sie bei der Skoliose in reiner Form vorfinden, sich auch auf das Becken, das die Körperlast von der Wirbelsäule auf die unteren Extremitäten weiterleitet, auswirken muß, dürfte erklärlich erscheinen. So finden wir denn, wenn auch nur in angedeuteter Form — denn das Sacrum bildet ja eine zusammenhängende Masse und kann infolgedessen nicht alle Bewegungen in gleichem Maße wie die freien Wirbelkörper mitmachen — bei den skoliotischen Krümmungen der Wirbelsäule eine seitliche Ausbiegung des Kreuzbeines, die eine longitudinale und transversale Streckung verursacht. Infolge dieser Beeinflussung des Kreuzbeines durch die Skoliosen wird das Becken asymmetrisch. Der schräge Durchmesser der mehr belasteten Knochenhälfte wird verkleinert, während der der minderbelasteten Seite verlängert wird.

Einfluß der Rachitis auf das Becken.

So liegen die Verhältnisse beim reinen Einfluß der Skoliose auf das Becken. Da als ursächliches Moment für die Bildung einer Skoliose neben der kongenitalen, statischen, traumatischen und emphysematischen hauptsächlich die rachitischen Skoliosen vorkommen, so wird die Gestaltung des Beckens noch bedeutend komplizierter, wenn man bedenkt, daß die rachitischen Veränderungen sich ja nicht nur an den betreffenden Wirbeln, sondern gleichzeitig auch am ganzen Becken

abspielen. Es kann hier an dieser Stelle nicht meine Aufgabe sein, sämtliche Kombinationen mit rachitischen Veränderungen klarzulegen. Es sei mir nur noch gestattet, auf die markantesten Veränderungen, die die Rachitis am Becken auslöst, hinzuweisen.

Bekanntlich finden sich bei der Rachitis die wesentlichen Veränderungen an der Knorpelknochengrenze, also da, wo das eigentliche Wachstum stattfindet. Die wachsende Knorpelsubstanz, die bei gefunden Kindern in Knochen umgewandelt wird, bleibt bei der Rachitis unverknöchert. Die einzelnen Knochen- und Knorpelstücke sind durch eine abnorm weichende Zwischensubstanz voneinander getrennt. Das dadurch im ganzen gelockerte Beckengefüge gibt dem Drucke der Rumpflast nach. Das Kreuzbein weicht dabei nach vorne aus, es kommt eine Abplattung zustande, die eine Verengung des Beckeneingangs bewirkt, während der Beckenausgang normal oder erweitert ist.

Bisher hatte ich mich auf die Beschreibung des Einflusses, den eine kyphotisch und eine skoliotisch veränderte Wirbelfäule auf die Form des Beckens ausüben, beschränkt. Welche Gestaltsveränderung macht nun das Becken durch, wenn eine durch Zusammenwirken von Kyphose und Skoliose verunstaltete Wirbelfäule also eine Kyphoskoliose vorliegt?

Das Becken bei Kyphoskoliosen.

Was die Ätiologie dieser Erkrankung anlangt, so beruht diese Art von Wirbelfäulenverkrümmung in den meisten Fällen auf einer manifesten Rachitis. Doch spielt außer der Rachitis, worauf schon K l a f f e n hingewiesen hat, noch eine Hypo- und Dysfunktion des Ovariums ätiologisch beim Zustandekommen einer Kyphoskoliose wahrscheinlich eine Rolle. Neben den schon beschriebenen durch Kyphose und Skoliose der Wirbelfäule hervorgerufene Veränderung am Becken wird man also bei der Kyphoskoliose noch mit Mißbildungen am Becken im Sinne einer Rachitis zu rechnen haben,

da ja die Rachitis — wie schon früher erwähnt — nicht nur die Wirbelsäule, sondern gleichzeitig auch das Becken befällt. Man sollte infolgedessen annehmen, daß das Becken bei Kyphoskoliosen abgesehen, von den schon beschriebenen Veränderungen in den meisten Fällen noch die für Rachitis charakteristischen Merkmale aufweisen muß. Dem ist aber nicht so. Der Grund hierfür ist darin zu suchen, daß das post-rachitische Wachstum des Beckens durch die geänderten Belastungsverhältnisse in einer Weise beeinflusst wird, daß die für Rachitis typischen Veränderungen am Becken mehr oder weniger verschwinden. Die Lastübertragung einer kyphoskoliotisch gekrümmten Wirbelsäule, deren kyphotischer Buckel sich im Laufe des Wachstums noch mehr steigert, wirkt sich nämlich auf die obersten Sacralwirbel in einem nach aufwärts und rückwärts hebelnden Zuge aus, wodurch das Knorpelwachstum im günstigsten Sinne beeinflusst wird. Ja, es gibt bei Kyphoskoliosen mit einwandfreier rachitischer Ätiologie Fälle, bei denen die rachitischen Merkmale derart verwischt sind, daß aus der Gestalt des Beckens allein die Diagnose „Rachitis“ nicht gestellt werden kann; ja, in vielen Fällen ist das Becken nicht nur verengt, in irgendeinem Durchmesser, sondern erweitert. Das rachitisch-platte Becken wird also bei der Kyphoskoliose gewissermaßen durch veränderte Belastungsmechanik in ein weites, geräumiges Becken umgewandelt. Auch die für Skoliose typischen Beckenveränderungen wirken sich, wenn eine Kyphoskoliose vorliegt, am Becken nur wenig aus.

Die Kenntnis dieser Beckendeformität ist für die Geburtshilfe von allergrößter Bedeutung. Zu häufig ist man nämlich geneigt, bei vorhandener Rückgratsverkrümmung im Sinne einer Kyphoskoliose von vorneherein ein rachitisches Becken anzusehen und demgemäß auch zu handeln.

Es bedarf noch des Hinweises, daß es natürlich auch Kyphoskoliosen-Becken geben kann, die starke Anzeichen einer Rachitis tragen können. Wenn nämlich das Becken

durch die Intensität und die lange Dauer der Rachitis sehr stark deformiert war, dann können erklärlicherweise die rachitischen Merkmale nicht in derartigem Maße zum Ausgleich gebracht werden. Daselbe gilt auch von den Becken, die infolge florider Rachitis der unteren Extremität asymmetrisch gebaut und mißgestaltet sind. Daß der Geburtsverlauf in derartigen Fällen besonders erschwert ist, braucht nicht besonders erwähnt zu werden.

Aus alledem geht schon hervor, daß das Becken bei Kyphoskoliosen kein konstantes sein kann. Während in dem einen Fall das Becken mehr dem des kyphotischen gleicht, wird vielleicht im anderen Fall ein im geringen Grade schräg verengtes Becken, wie man es bei der Skoliose antrifft, vorliegen. In einer Reihe weiterer Fälle wird eine floride Rachitis dem Becken ihr Gepräge aufdrücken. In wieder anderen Fällen wird man Kombinationsformen dieser oder jener Art antreffen. Ganz allgemein kann man aber die Feststellung machen, daß dem geburtsmechanischen Geschehen bei Kyphoskoliosen von seiten des knöchernen Beckens nicht allzu große Schwierigkeiten entgegengebracht werden.

In der folgenden Tabelle habe ich die Beckenmaße von 32 Patientinnen, die in einem Zeitraum von 20 Jahren (1912—1932) in der Bonner Universitäts-Frauenklinik entbunden wurden, angeführt. Die Patientinnen hatten zum Teil eine recht erhebliche kyphoskoliotische Verkrümmung der Wirbelsäule.

B e c k e n m a ß								
Name	Alter	Para	Kunsthilfe	Kindes'age	Dist. spin.	Dist. christ.	Conj. ext.	Conj. diag.
1 Frl. H.	24	I	spontan	1. Schädellage	22,5	24	18	—
2 Frau M.	20	I	"	"	24	25	18,5	—
3 Frau St.	36	I	Section	—	26,5	27,5	—	—
4 Frl. B.	20	I	spontan	1. Schädellage	23,5	27	18	—
5 Frau J.	25	II	"	"	26	28,5	19	—
6 Frau B.	41	III	Wendg.u.Extrakt	Querlage	27,5	29	18	—
7 Frl. J.	23	I	spontan	1. Schädellage	27	28	—	11,5
8 Frl. G.	28	II	Section	—	27,5	28,5	—	10
9 Frau K.	28	II	spontan	1. Schädellage	24,0	25	18	12
10 Frau Sch.	43	VIII	"	"	26,5	28	18	12
11 Frau W.	43	IX	Forceps	"	26	28	18	—
12 Frau B.	27	I	"	"	26,5	27,5	—	10,5
13 Frl. B.	29	I	spontan	"	22	24	17,5	—
14 Frl. St.	41	I	"	2. Schädellage	25	26	—	11,5
15 Frau Sch.	34	II	Extrakt.	Fußlage	26,5	27,5	16,5	10
16 Frau H.	30	II	Section	—	28	29	17	—
17 Frl. B.	2	I	"	—	25	26,5	16,5	9,5
18 Frl. B.	23	I	spontan	1. Schädellage	26	27,5	17,5	—
19 Frl. K.	22	I	"	"	25	26	—	10,5
20 Frl. S.	23	I	"	2. Schädellage	23	27,5	17	—
21 Frl. O.	25	I	"	Steißlage	25	27	18	—
22 Frl. L.	30	I	"	Fußlage	25,5	26,5	—	10,5
23 Frau L.	25	I	Section	—	28	29	16,5	9,5
24 Frl. Sch.	27	I	spontan	1. Fußlage	26,5	28	19,5	—
25 Frl. N.	21	I	"	2. "	26	27,5	18	—
26 Frl. Rh.	23	I	"	1. "	26	27	17	—
27 Frau K.	42	I	"	1. "	28,5	31	18,5	—
28 Frl. F.	30	I	Section	"	24	25	15	—
29 Frl. Sch.	32	I	spontan	2. "	22,5	25	18	—
30 Frl. K.	21	I	"	1. "	25	28	17,5	—
31 Frl. M.	22	I	Section	2. "	29	31,5	22	—
32 Frl. N.	26	I	"	—	20,0	21	17,5	—

Wie aus der Übersichtstabelle schon hervorgeht, lag in 6 von 32 Fällen ein Beckcken vor, das wegen seiner Verengerung ein operatives Vorgehen erheischte und zwar handelte es sich in einem jeden dieser Fälle um ein plattrachitisches Becken II.^o. Die Geburtsberichte dieser Patientinnen lassen einwandfrei erkennen, daß auch am übrigen Knochen skelett die rachitischen Merkmale sehr stark ausgeprägt waren. Mithin war die Verengerung bei diesen Gravida nicht auf die Kyphoskoliose an sich, sondern auf eine außergewöhnlich heftige Rachitis zurückzuführen. Von den übrigen 26 Patientinnen hatten 2 weitere ebenfalls ein plattrachitisches Becken II.^o. Die Geburt bei diesen verlief jedoch in einem Falle spontan, während bei der zweiten Patientin eine Wendung und Extrak tion wegen Querlage vorgenommen wurde. Zwei andere Kyphoskoliosen hatten ein in geringem Grade schräg verengtes und endlich zwei weitere ein im Ausgang mäßig querverengtes Becken. Diese Verengerungen waren aber geburtshilflich von untergeordneter Bedeutung, da die betreffenden Geburten spontan und störungslos verliefen. Die Becken aller übrigen in der Tabelle angeführten Kyphoskoliosen waren weit, zum mindesten aber nicht verengt und setzten daher der Geburt keinerlei Schwierigkeiten in den Weg.

So verliefen denn von den 32 Geburten 21 spontan, d. h. 65,6%. In 7 Fällen mußte die Entbindung durch Kaiserschnitt erfolgen, und zwar lag 6mal ein plattrachitisches Becken II.^o vor. Bei der 7. Gravida handelte es sich um ein plattrachitisches Becken ersten Grades (conjugata vera 10 cm) mit gleichzeitiger Verengerung des schrägen Durchmessers und Querverengerung des Beckenausganges. Die Indikation zur Sektio wurde bei dieser Patientin gestellt, weil der Kopf sich nicht einstellte. Die Patientin erlag im Wochenbett einer cardialen Insuffizienz. Ich komme noch später eingehender darauf zurück. Bei zwei Kyphoskoliosen mußte die Geburt durch Anlegen einer Zange beendet werden und zwar in

beiden Fällen wegen drohender Asphyxie des Kindes. In einem Falle hatte sich die Nabelschnur 4mal um den Hals gefchlagen; das Kind kam zwar lebend zur Welt, starb aber wenige Stunden später, da die Atmung nicht regelrecht in Gang kam. Die Wa-Reaktion bei dieser Frau war positiv.

Was den Verlauf der Schwangerschaft bei den meisten Kyphoskoliosen anbelangt, so unterschied er sich nach den Beschreibungen der einzelnen im allgemeinen nur unwesentlich oder überhaupt nicht von denen, die ohne Wirbelfäulenkrümmung eine Schwangerschaft durchmachen. Nur von 5 Patientinnen wurden geringe dyspnoische Beschwerden in den letzten 6—8 Wochen der Gravidität angegeben. Auch Geburtsverlauf und Wochenbett wickelten sich bei 30 dieser Kyphoskoliosen ohne jegliche Störung ab, wenn auch der Puls bei einigen unter der Geburt und in der ersten Zeit des Puerperiums etwas erhöht war. Insbesondere stellte sich heraus, daß die operativen Eingriffe genau wie von Normalgebärenden ertragen wurden. Das Herz sämtlicher Kyphoskoliosen zeigte perkutorisch und auskultatorisch neben gewissen durch die Thoraxdeformität bedingten Lageanomalien keine Veränderungen bis auf 2 Fälle, die ich später eingehender erörtern werde.

Bezüglich des Alters der Kinder erscheint mir erwähnenswert, daß einmal eine Frühgeburt im 7. und zweimal eine solche im 8. Monat vorlag. Die übrigen Kinder waren ausgetragen. Das Gewicht der Kinder war im ganzen etwas niedriger als bei Normalfällen.

Wenn man dieses Resultat der Geburt bei Kyphoskoliosen als Ganzes sieht und bedenkt, daß nicht nur die Wirbelfäule bei diesen Patientinnen stark deformiert, sondern mit ihr oft der ganze Körper verunstaltet war, so muß man doch dieses Endergebnis als befriedigend hinstellen. Man könnte einwenden, daß es sich bei den beschriebenen Fällen um kyphoskoliotische Krümmungen mehr oder minder leichten Grades gehandelt habe. Das ist aber nicht so. Bei 17 Patien-

tinnen ist in den Geburtsberichten vermerkt, daß die kypfokoliotische Krümmung der Wirbelsäule hochgradiger Natur war. Als der Sitz der Wirbelsäulendeformität war in den weitaus meisten Fällen die untere Brust- und Lendenwirbelsäule angegeben.

Wie aus der Zusammenstellung weiter hervorgeht, sind von den 32 Gebärenden 2 Patientinnen im Verlaufe des Wochenbetts gestorben. Diese Tatsache muß unser Augenmerk auf eine andere, weit gefährlichere Komplikation als die durch Kyphoskoliose der Wirbelsäule bedingte Becken deformation richten, das ist das Herz. Wir wissen, daß je nach der Höhe des Sitzes der Wirbelsäulendeformität eine Einengung des Brustkorb und eine Verlagerung seiner Eingeweide zustande kommen kann. Wenn der Sitz der Verkrümmung im Bereiche der Brustsegmente liegt, wird natürlich die Raumbeschränkung für die Eingeweide der Brusthöhle eine viel größere sein als bei tieferem Sitz der Deformität. Auch das Herz wird in dem einen Fall bedeutend erschwerter arbeiten müssen als in dem anderen Fall.

Betrachtet man die intrathorakalen Verhältnisse bei Kyphoskoliose eingehend, so wird man erkennen, daß durch die Wirbelsäulendeformität die eine Lunge häufig komprimiert und atelektatisch ist, während die andere kompensatorisch erweitert, d. h. emphysematös ist. Hierdurch wird der Widerstand im kleinen Kreislauf erhöht. Als Folge hiervon wird der rechte Ventrikel hypertrophieren, während das Myokard mehr oder weniger degeneriert. Der Widerstand im kleinen Kreislauf wird weiter erhöht durch die Inspirationsstellung des Thorax und die Verknöcherung der Rippenknorpel. Bei hohem Sitz der Wirbelsäulendeformität kommt es nämlich zu einer nach abwärts gerichteten Steilstellung der Rippen, die eine Inspirationsstellung des Thorax bedingt. Hierdurch wird die thorakale Atmung stark behindert, wenn nicht fast unmöglich gemacht, zumal dann, wenn, wie bei den meisten Kyphoskoliosen, eine vorzeitige Verknöche-

rung der Rippenknorpel einsetzt. Von einer Zwerchfellatmung, die eine thorakale Atmung bis zu einem gewissen Grade ersetzen könnte, ist bei Kyphoskoliosen ebenfalls nicht viel zu erwarten. Denn das Zwerchfell ist gewöhnlich infolge der gleichzeitig vorliegenden Thoraxdeformität abgeflacht und schließt, wie ein gespanntes Segeltuch ohne Kuppenbildung Brust- und Bauchraum voneinander ab. Da ausgedehnte Zwerchfellexkursionen den Zufluß des venösen Blutes zum Herzen begünstigen, so wird bei fehlender Zwerchfellatmung dies ein weiterer ungünstiger Faktor in der Blutzirkulation darstellen.

Aber nicht nur im kleinen Kreislauf hat das kyphoskoliotische Herz gegen Widerstände anzukämpfen, sondern auch im großen. Denn mit der Knickung der Wirbelsäule kommt es gewöhnlich auch zur Verlagerung und Abknickung der großen Gefäße. Um diese Widerstände zu überwinden, wird auch der linke Ventrikel sich erweitern und hypertrophieren. Daneben ist nicht selten das Herz der Kyphoskoliosen infolge der Thoraxeinengung selbst verdrängt und dadurch in seiner Ausdehnung behindert.

All diese die Zirkulation ungünstig beeinflussenden Faktoren machen das „kyphoskoliotische Cor“ aus. Es ist klar, daß ein solches Herz, das schon unter normalen Umständen eine Mehrarbeit verrichten muß, die auch die letzten Reservekräfte in Anspruch nimmt, erlahmen muß, wenn weitere Anforderungen gestellt werden. Daß Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett eine solche Mehrbelastung für das kyphoskoliotische Cor darstellen, steht wohl außer jedem Zweifel. Schon in den letzten Monaten der Schwangerschaft wird durch die gewaltige Ausdehnung des Uterus der Thorax temporär noch mehr eingeengt, während die Organe der Bauchhöhle, die schon durch die Abknickung der Körperachse verkleinert ist, eine weitere Zusammendrängung und damit eine wesentlich erschwere Blutzirkulation erfahren. Auch steht dem wachsenden Uterus bei hochgradiger Kypho-

Skoliose nicht genügend Raum zur Verfügung. Es bildet sich daher häufiger bei Erstgebärenden ein Spitzbauch, bei Mehrgeschwängerten ein Hängebauch aus, der nicht selten zu Lageanomalien führt. Dies stellt ebenfalls eine ungünstige Komplikation im normalen Ablauf der Geburt dar.

Bringt schon die Schwangerschaft bei Kyphoskoliosen daher nicht zu unterschätzende Gefahren, die auf eine Mehrbelastung des schon geschädigten Herzens hinzielen und sich in Atemnot, Kurzatmigkeit, vermehrte Stauungsbronchitis usw. äußern, mit, so muß diese Gefahr im Verlaufe der Geburt und im Wochenbett aufs äußerste steigern. Schon die Eröffnungsperiode hat starke Druckschwankungen im Gefolge, die durch wechselnde Uteruskontraktionen bedingt sind. Bei jeder Wehe wird das venöse Blut aus den Gebärmuttergefäßen gepreßt, während der Einfluß des arteriellen Blutes erschwert ist. Das ist schon für ein gesundes Herz eine nicht zu unterschätzende Belastung. Diese Belastung erfährt eine weitere Erhöhung in der Austreibungsperiode. Schon Frey hat darauf hingewiesen, daß während der Preßwehen eine ausgedehnte Blutverschiebung stattfindet, da durch die Steigerung des intraabdominellen Druckes die Bauchgefäße ausgepreßt würden. Ferner wird beim Wehenschmerz reflektorisch die Gefäßmuskulatur erregt, wodurch eine Erhöhung des arteriellen Blutdrucks zustande kommt. Dadurch wird das Herz während der Preßwehen einmal mit venösem Blut überfüllt und zweitens durch den erhöhten Tonus der Gefäße auf erhöhten Druck gebracht. Diese Mehrarbeit muß von einem Herzen vollbracht werden, das schon unter erschweren Bedingungen arbeitet.

Mit der Entleerung des schwangeren Uterus sind die Gefahren, die dem kypotkoliotischen Cor drohen, aber keineswegs überwunden. Es ist das Verdienst Haupts, darauf hingewiesen zu haben, „daß auch noch längere Zeit nach der Geburt vermehrte Arbeit vom Herzen zu leisten ist“. Infolgedessen wird auch im Wochenbett ein der Schwangerschaft

ähnlicher Gefährzustand bei den Kyphoskoliosen bestehen bleiben.

Von seiten des Herzmuskels sind also in der Schwangerschaft, unter der Geburt und im Wochenbett eine genügende Reservekraft und von seiten des Gefäßsystems eine entsprechende Anpassungsfähigkeit an die schwankenden und zunehmenden Stromwiderstände des Kreislaufs erforderlich. Wenn daher Herz und Kreislauf der Kyphoskoliosen in diesen entscheidenden Augenblicken versagen und der sich allmählich ausbildenden Mehrbeanspruchung nicht gewachsen sind, dann wird ein letaler Ausgang unvermeidlich sein.

Auch an der hiesigen Frauenklinik sind unter den angeführten 32 Geburten 2 Todesfälle zu beklagen. Die Mortalität betrug also 6,25%.

Im ersten Fall handelte es sich um eine 41jährige Erstgebärende, die unter den Erscheinungen der Herzinsuffizienz am 30. Tag post partum ad exitum kam. Der Wichtigkeit halber lasse ich den Geburtsbericht in aller Kürze folgen.

Anamnese: Eltern tot; Vater ertrunken, Todesursache der Mutter unbekannt. Eine Schwester lebt und ist gesund.

Sie selbst lernte mit 4 Jahren laufen. Außer Keuchhusten und Mäfern nie ernstlich krank gewesen. Erste menses mit 15 Jahren, regelmäßig alle 28 Tage von 4—5tägiger Dauer bei normalem Blutverlust. Letzte Mensis Anfang April 1922; Juli 1922 erste Kindsbewegungen.

Normaler Schwangerschaftsverlauf; in den letzten Wochen geringe dyspnoische Beschwerden. 16. II. 22 Aufnahme in die Klinik.

Status: Sehr kleiner gedrungener Körperbau mit hochgradiger Kyphoskoliose der unteren Brustwirbelsäule nach rechts. Die rechte Scapula ist bis zur waagerechten Stellung nach oben und außen gedrängt. Höchstend beider Schultern. linke Thoraxpartie nach innen gezogen. Keine Weichteilschwellungen.

Herz: Grenzen perkutorisch nicht erweitert. Töne rein.

Lunge: Geringe Stauungsbronchitis.

Urin: o. B.

Temperatur: 36,8°, Puls 72, 84.

Äußere Untersuchung: Uterus längsoval (nach links verlagert. Fundus drei Querfinger oberhalb des Nabels. Kopf über dem Beckeneingang, Rücken rechts, kleine Teile links.

Leibesumfang 82 cm.

Innere Untersuchung: Äußere Geschlechtsteile livide verfärbt, Scheide eng, portio ausgezogen.

Beckenmaße: Dist. spin. 25,0 cm, dist. crist. 26,0 cm, Conj. diag. 11,0 cm.

Befonderes: Symphysenbuckel nur angedeutet. Seitliche Beckenwand rechts sehr gut zu erreichen; sehr weite Kreuzbeinaushöhlung.

16. 11. 1922, 6 Uhr Wehenbeginn.

17. 11. 1922, 12.40 Uhr Blasenprung. 12.50 Uhr Sponangeburt eines lebenden Mädchens (1300 g) im 7.—8. Monat. 1.40 Uhr Nachgeburt, vollständig.

Puls nach der Geburt relativ klein und stark beschleunigt. Weiterer Wochenbettsverlauf in Bezug auf die Geburt komplikationslos, jedoch zunehmende Insuffizienzerrscheinungen von seiten des Herzens. Atmung wird schwer und frequent. Zunehmende Oedeme. Diefierhalb erfolgte am 2. 12. 1922 Verlegung zur Medizinischen Klinik. Dort Exitus letalis am 17. 12. 1922 unter den Erscheinungen der cardialen Insuffiziens.

Im zweiten Fall handelte es sich ebenfalls um eine Erstgebärnde, die 26 Jahre alt war. Die Familienanamnese der Patientin zeigt keine Besonderheiten. Aus der eigenen Anamnese zu hervorzuheben, daß die Patientin mit 1½ Jahren angeblich eine Rachitis und mit 4 Jahren eine Polyomyelitis durchmachte. Erste Menfis mit 18 Jahren, die weiteren alle

28 Tage, Dauer 4—5 Tage bei normalem Blutverlust. Letzte Menfis vom 23.—27. 1. 1932. Anfang Juni 1932 erste Kindsbewegungen.

Die Schwangerschaft verlief in den ersten Monaten mit häufigem Erbrechen, in den letzten 6—8 Wochen zunehmende Atemnot, die besonders beim Liegen in die Erscheinung trat. Patientin ist bettlägerig, da der orthopädische Stützapparat nicht in Ordnung ist.

Befund: Zustand nach Polyomyelitis anterior. Schlaffe Lähmung der unteren Extremitäten. Atrophie der linksseitigen Gliedmaßen, hochgradige Kyphoskoliose der unteren Brustwirbelsäule nach rechts. Rachitischer Rosenkranz. Säbelscheidenbein. Leichte Verbreiterung des Herzens nach rechts und links. Herztöne rein. Stauungsbronchitis. Urin: Alb. (+).

Außere Untersuchung: Brüste hypertrophisch, Warzen faßbar. Größere Resistenz rechts, kleine Teile links, Herztöne +, Kindsbewegungen +, Leibesumfang 92 cm.

Vaginale Untersuchung: 7. 10. 1932. Schamfuge spitz. Beckenknochen dünn, portio sehr weit nach hinten. Beckeneingang austastbar, mäßig schräg verengt. Kopf über dem Becken zu fühlen. Promontorium mit 2 Fingern erreichbar. Der gerade Durchmesser ist nicht verengt, während der quere leicht verengt erscheint. Bilicky X. Dist. spin. 20; dist. crist. 21; conj. ext. 17,5; conj. vera 10,10.

Diagnose: Mens X, 1. para, 1. Schädellage.

Da der Kopf sich nicht einstellte, wird am 17. 11. 32 der Entschluß zur Sectio gefaßt, die wegen des kyphoskoliotischen Cor in Lokalanästhesie + Evikan — Natrium ausgeführt wird.

Schon während der Operation tritt eine schwere Asphyxie auf, von der die Patientin sich nur allmählich erholt. Im weiteren Verlaufe des Wochenbetts treten trotz energischer Herz- und Kreislauftherapie erneute asphyxistische Beschwerden auf, bis die Patientin am 7. Tage des Puerperiums unter

den Erscheinungen der allmählich erlahmenden Herzkraft ad exitum kommt.

Durch die ausgeführte Obduktion wurde der klinisch erhobene Befund sichergestellt. Die rechte Lunge war infolge der kyphoskoliotischen Verbiegung der Wirbelsäule hochgradigst komprimiert und fast vollkommen atelektatisch, während die linke Lunge relativ guten Luftgehalt aufwies. Der rechte Herzventrikel war stark hypertrophisch und dilatiert, das Herz selbst zeigte reichliche Fettdurchwachsung und ausgesprochene Schwielenbildung.

Es besteht kein Zweifel, daß beide Patientinnen einem primären Herztod im Wochenbett erlagen.

Im ersten Fall trat der Tod am 30. Tage des Wochenbetts ein. Weder während der Schwangerschaft noch auch unter der Geburt hatten sich, abgesehen von äußerst geringfügigen Atembeschwerden, die geringsten Anzeichen eines muskelgeschädigten Herzens bemerkbar gemacht. Sowohl Eröffnungs- als auch Austreibungsperiode verliefen komplikationslos und unterschieden sich nicht von denen bei Normalgebärenden. Aber schon bald nach der Geburt stellten sich die ersten Zeichen der langsam verfallenden Herzkraft ein. Die Atmung wurde erschwert, der Puls klein und flackrig und zunehmende Oedeme wiesen auf das bevorstehende Ende hin.

Auch bei der zweiten Patientin lag ein einwandfreier Herztod vor. Bereits in den letzten 6 Wochen der Gravidität hatte die Patientin unter Kurzatmigkeit zu leiden gehabt und war dieserhalb in die Klinik aufgenommen worden. Unter der sofort einsetzenden Herztherapie waren die Erscheinungen schnell zurückgegangen und die Atembeschwerden vollkommen behoben, sodaß begründete Hoffnung auf einen normalen Ablauf der Geburt bestand. Trotzdem der Patientin die schweren Anstrengungen der Geburt zum großen Teil durch die Schnittentbindung erspart blieben, erfolgte der Tod im Wochenbett. Auch die ununterbrochene

Herztherapie (Traubenzucker, Digitalis, Kreislaufmittel usw.) hatten den tödlichen Ausgang, der sich unter dem Bilde eines cardialen Asthmas mit starker Zyanose manifestierte, nicht aufzuhalten vermocht. Wie aus dem Obduktionsprotokoll hervorgeht, lag eine schwere Herzschädigung vor, die als Folgezustand der kyphoskoliotischen Wirbelsäulenverkrümmung gewertet werden muß.

In beiden Fällen war also das Herz der Kraftleistung der Geburt nicht mehr gewachsen und erlag im Puerperium.

Fassen wir das Ergebnis dieser Abhandlung noch einmal kurz zusammen, so können wir zunächst feststellen, daß Geburten bei Kyphoskoliosen doch eine gewisse Seltenheit darstellen. Von den 20 666 Schwangeren, die in den betreffenden Zeitraum von 20 Jahren an der Bonner Universitäts-Frauenklinik entbunden wurden, waren 32 Gravida, d. h. 1,5 pro Mill., die eine kyphoskoliotisch verunstaltete Wirbelsäule hatten. Des weiteren darf als erwiesen erachtet werden, daß das Becken bei Kyphoskoliosen im allgemeinen weit ist, aber auch häufig Veränderungen im Sinne einer Rachitis aufweisen kann, nämlich dann, wenn die Rachitis außergewöhnlich heftig war und am übrigen Skelettsystem sehr stark ausgeprägt ist. Hinsichtlich der konsekutiven Herzveränderungen bei Kyphoskoliosen wäre zu sagen, daß diese sicherlich eine schwere und ernste Komplikationen darstellen, in den weitaus meisten Fällen jedoch das Herz der Kyphoskoliosen den durch die Schwangerschaft bedingten Anforderungen gewachsen zu sein scheint.

Aus den beiden Todesfällen ergibt sich für uns die Forderung, das Herz der Kyphoskoliosen frühzeitig mit allen uns diagnostisch zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln zu erfassen versuchen, um seine noch vorhandene Arbeitskraft abzuwiegen und abzumessen. Das Ergebnis dieser Feststellung wird dann unser jeweiliges Handeln bestimmen müssen.

Zum Schlusse meiner Arbeit ist es mir eine angenehme
Pflicht, Herrn Geh.Rat Prof. Dr. v. Franqué für die
Überlassung des Themas sowie Herr Prof. Dr. Haupt für
die freundliche Beratung ergebenst zu danken.

Literaturverzeichnis.

Archiv für Gynäkologie 1927 Bd. 129.

Menstruations- und Gestationsverhältnis bei Kyphoskoliosen. Dr. E. Klasten.

Archiv für Gynäkologie 1927 Bd. 130.

Über das Cor Kyphoskoliotikum in der Gestation.

Dr. P. Klein.

Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie Bd. 89. 1925.

Cor Kyphoskoliotikum und Gestation.

Dr. Heidler.

Kreislauf und Kreislaufstörung in ihren Beziehungen zur Geburtshilfe und Gynäkologie.

Von Professor W. Haupt. Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie 1932. Bd. 103.

Breus und Kolisko. Die pathologischen Beckenformen. Bd. 3. und 3 I.

Bumm: Lehrbuch der Geburtshilfe.

Lebenslauf.

Am 25. Februar 1904 wurde ich, Sohn des verft. Stadtbaurats Theodor Lienkamp zu Gladbeck in Westfalen geboren. Nach Besuch der Elementarschule kam ich im Jahre 1914 auf das humanistische Gymnasium in Bottrop, das ich nach bestandener Reifeprüfung Ostern 1923 verließ, um mich dem medizinischen Studium zu widmen. Ich studierte an den Universitäten Münster, München, Berlin, Wien und Kiel. Nach 10semestrigem Studium unterzog ich mich an der letztgenannten Universität mit Erfolg der medizinischen Staatsprüfung. Die Approbation erhielt ich am 16. Mai 1929.

Bonn, den 19. Juli 1934.

